


Сумський Національний Аграрний Університет
Факультет Агротехнологій та природокористування
Кафедра Захисту рослин

Звіт про проходження виробничої практики в умовах Маловисторопського коледжу СНАУ

Виконав студент групи
ЗР 1901 -01
Дмитрівський Олександр
Ігорович



Маловисторопський коледж знаходиться у с. М.

Вистороп

- **Село Малий Вистороп розташоване у мальовничій місцевості на відстані 35км від районного центру-міста Лебедин**
- **З обласним центром-містом Суми, село Малий Вистороп відділяє - 56 км; а з найближчою залізничною станцією Боромля, відстань становить лише 7км.**
- **Від господарства до районного і обласного центру та до найближчої залізниці є дорога з твердим покриттям.**

НВЧАЛЬНИЙ КОЛЕДЖ



- **Загальна площа сільськогосподарських угідь господарства складає 210,4 га,**
- **в тому числі:**
- **ріллі-158.8 га,**
- **Основний напрямок у рослинництві-вирощування зернових культур:
озима пшениця,ячмінь,овес, соя**

Збирання сої Дон-1500



Оранка під пшеницю



Передпосівне рихління грунту під посів озимої пшениці



Посів озимої пшениці



Підживлення озимини



ДОГЛЯД ЗА КОЛЕКЦІЙНО-ДОСЛІДНИМ ПОЛЕМ



Тема наукової роботи: ОСНОВНІ ХВОРОБИ ЯБЛУНІ В УМОВАХ МАЛОВИСТРОПСЬКОГО КОЛЕДЖА СНАУ ІМ. П.С. РИБАЛКО

В умовах Маловистропського коледжа СНАУ ім. П.С. Рибалко спостерігали борошністу росу та моніліоз, або плодова гниль. Для дослідної роботи брали 5 зимових сортів яблунь: Аскольд, Едера, Перлина Києва, Радогость.

Облік ураження пагонів і суцвіть проводять у фазу розпускання бруньок, у період цвітіння, на початку утворення плодів. Для цього на облікових деревах з чотирьох боків крони оглядають по 25 листків та інтенсивність їх ураження оцінюють за шестибальною шкалою. Ураження плодів гнилями обліковують в період фізіологічного опадання надмірної зав'язі (поява падалиці), а також під час збирання врожаю. Для цього під обліковими деревами збирають опалі плоди і підраховують кількість гнилих. Оцінку інтенсивності ураження плодів проводять за універсальною бало-відсотковою шкалою.

Таблиця 1. Ураження плодовою гниллю

| Сорт | Фаза проведення обліків | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|
| | I, <u>Ріст плодів</u> | | II, <u>достигання плодів</u> | | III, <u>перед збиранням врожаю</u> | |
| | <u>Поширеність хвороби, %</u> | <u>Розвиток, %</u> | <u>Поширеність хвороби, %</u> | <u>Розвиток, %</u> | <u>Поширеність хвороби, %</u> | <u>Розвиток, %</u> |
| Аскольда | 28 | 5,1 | 30,1 | 5,8 | 33 | 6,2 |
| Едера | 27 | 5,4 | 28,5 | 6,7 | 30,3 | 6,9 |
| Радогость | 22,5 | 7,0 | 37,5 | 12,2 | 37,5 | 12,2 |
| Перлина Києва | 26 | 7,9 | 29,6 | 8,1 | 30,4 | 8,8 |
| Флоріна | 22,3 | 12,3 | 25,7 | 12,9 | 30,3 | 13,3 |

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

